


Estudio de estimulación de secretina

Instrucciones preparatorias



☐ **HABLE DE SUS MEDICAMENTOS** y de aquellos problemas médicos que pueda tener con su médico. Su médico le proporcionará instrucciones sobre cómo ajustar apropiadamente sus medicamentos antes de someterse a la prueba. Las instrucciones podrán incluir los siguientes cambios:

- Si es diabético, es posible que sea necesario ajustar sus medicamentos. Por favor, consulte con el médico que se los recetó.
- Tome sus medicamentos habituales un mínimo de 2 horas antes de la prueba con una pequeña cantidad de agua.



☐ **PIDA UNA CITA** para el estudio de estimulación de secretina. Por favor, llame a nuestro **Centro de Comunicación de Pacientes (PCC, por sus siglas en inglés)** al **310-825-7540** para fijar la fecha del estudio de estimulación de secretina, en caso de que no se la dieran durante su visita a la clínica. Nota: es posible que el PCC le llame también para darle la fecha del procedimiento.



LUGAR DE LA PRUEBA El estudio de estimulación de secretina lo llevará a cabo un **enfermero o enfermera** en el lugar indicado:

☐ **UCLA Medical Center**
100 UCLA Medical Plaza #205
 Los Angeles, CA 90095

Fecha _____

Hora _____

(Por favor, llegue 30 minutos antes de la hora prevista para el procedimiento)

SI ESTÁ TOMANDO ALGUNO DE LOS MEDICAMENTOS QUE FIGURAN A CONTINUACIÓN, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:



7 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA

- DEJE DE TOMAR inhibidores de la bomba de protones. Estos incluyen, aunque sin limitarse a ellos, los siguientes: rabeprazol (Aciphex), omeprazol (Prilosec), lansoprazol (Prevacid), dexlansoprazol (Dexilant), esomeprazol (Nexium) y pantoprazol (Protonix).
- EMPIECE A TOMAR 40 mg de famotidina 40 mg (Pepcid) cada 6 horas.



2 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA

- DEJE DE TOMAR famotidina.
- EMPIECE A TOMAR un antiácido (Maalox, Mylanta, Roloids o TUMS) según sea necesario hasta la medianoche de la noche anterior a la prueba.



12 HORAS ANTES del procedimiento, no coma ni beba nada.



LA MAÑANA DE LA PRUEBA tome todos los demás medicamentos que toma normalmente por la mañana con un sorbo de agua, a menos que su médico le indique lo contrario.

¿EN QUÉ CONSISTE UN ESTUDIO DE ESTIMULACIÓN DE SECRETINA Y QUÉ PUEDO ESPERAR QUE OCURRA DURANTE EL PROCEDIMIENTO?

Los estudios de estimulación de secretina se utilizan para medir los niveles de gastrina después de recibir una hormona llamada secretina. La gastrina y la secretina intervienen en el proceso digestivo.

Se comprobará la cantidad de gastrina en su sangre antes y después de recibir una dosis de secretina.

Durante este procedimiento un enfermero o enfermera le extraerá sangre siete veces diferentes. Para evitar insertar una aguja cada vez, le colocarán una vía intravenosa (IV) periférica en el brazo. Durante cada una de las extracciones de sangre se extraerá una pequeña cantidad de sangre (el equivalente a una cucharilla). La vía intravenosa también permite que le administren una dosis de secretina.

Le extraerán sangre dos veces antes de administrar la secretina. Una vez administrada la secretina, le extraerán sangre 5 veces más a diferentes intervalos programados. Una vez terminadas las extracciones de sangre, le quitarán la vía intravenosa y usted podrá regresar a sus actividades habituales. La prueba tarda alrededor de una hora en realizarse.

